

ଜୈବିକ ଗୁଣସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ

ଜୈବିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦମୂଳ ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ, ଏନ୍‌ଡ୍ରୋସିଆନିନ, ଭିଟାମିନ୍- ‘ସି’ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରି ଖାଦ୍ୟସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଭରପୁର ଅଛି । ଏହା ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିଥାଏ । କୋବିଡ୍-୧୯ ପରି ମହାମାରୀର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ, ଏନ୍‌ଡ୍ରୋସିଆନିନ ଖାଦ୍ୟସାର ଯୋଗୁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତ ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କନ୍ଦରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏନ୍‌ଡ୍ରୋସିଆନିନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ନ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ୟାନ୍‌ସର ପ୍ରତିରୋଧକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ଏହାର ଡାଏଟାରୀ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଶରୀରର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଲ୍‌ସର ଏବଂ କୋଲନ୍ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାର କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ଶରୀରର କୋଲେଷ୍ଟରଲ ବା ଚର୍ବିକାତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଏହା ଉତ୍ତମରୂପେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଶରୀରର କୋଷମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭିଟାମିନ୍- ‘ଏ’ ଅଭାବ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଭାବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଦମୂଳକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କନ୍ଦମୂଳରେ ଥିବା ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନରୁ ଭିଟାମିନ୍-‘ଏ’ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍- ‘ଏ’ ପାଇଁ କନ୍ଦମୂଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ । ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଶିଝା ହୋଇଥିବା ଭୂ-ସୋନା କିସମର କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ‘ଏ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଅନ୍ଧତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା:

କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଏବଂ ଉପ-ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଜମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦୦ ମି. ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ଦିନବେଳା ଉତ୍ତାପ ୨୪୦ ସେଲ୍‌ସିୟସ୍ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧା, ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଶୀତୁଆ ରାତି ପାଇଲେ କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲ ପାଇଁ ହାରାହାରି ୫୦୦ ମି.ମି. ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସମାନୁପାତଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଛାଇ ବରଫପାତ କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ନିଗିଡ଼ା, ଦୋରସା, ବାଲିଆ, ମଟାଳ ମାଟି କନ୍ଦମୂଳ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ୫.୦ରୁ ୬.୫ ପି.ଏଚ୍. ଥିବା ମାଟିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ପାଣି ଜମୁଥିବା ମାଟିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

ଫସଲ ଲଗାଇବା ସମୟ:

ଅଣଜଳସେଚିତ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଫସଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦମୂଳ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।

ପୁଷ୍ଟିକର କନ୍ଦମୂଳ କିସମ:

ଭୂ-କ୍ରିଷା: ଉତ୍ତମ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । କନ୍ଦର ଚୋପା ଗାଡ଼ ନାରଙ୍ଗୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶସ ମଧ୍ୟ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୫ରୁ ୧୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୨୦ରୁ ୨୫୦ କିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କନ୍ଦରେ ପ୍ରାୟ ୮୫ରୁ ୯୦ ଏମ୍.ଜି. ଆନ୍‌ଡ୍ରୋସିଇନିନ୍ ନାମକ ଆର୍ତ୍ତଅକ୍ତିତାଷ୍ଟ ଥାଏ ।



ଭୂ-ସୋନା: ଉତ୍ତମ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଉତ୍ତମ ଚୋପା ଓ ଶସ କମଳା ରଙ୍ଗ । ୧୧୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନରେ ଅମଳହୁଏ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ କିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ଦିଏ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କନ୍ଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ରୁ ୧୪.୦ ଏମ୍.ଜି. ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।



ଭୂ-କାନ୍ତି: ଉତ୍ତମ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଚୋପା ଧଳା ଓ ଶସ କମଳା ରଙ୍ଗ । ୧୧୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦୦ରୁ ୨୩୦ କିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କନ୍ଦମୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୬.୨ ରୁ ୭.୬ ଏମ୍.ଜି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।



ଗୌରୀ: ଉତ୍ତମ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଚୋପା ଇଷ୍ଟ ଲାଲ୍ ଓ ଶସ କମଳା ରଙ୍ଗ । ୧୧୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫୦ରୁ ୧୯୦ କିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କନ୍ଦମୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ରୁ ୫.୫ ଏମ୍.ଜି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।



ଭୂ-କା: ଉତ୍ତମ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ । ଚୋପା ଲାଲ୍ ଏବଂ ଶସ ମଧ୍ୟ କମଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ କିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କନ୍ଦମୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ରୁ ୬.୫ ଏମ୍.ଜି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟାକ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।



ବିହନ:

କନ୍ଦମୂଳ ତଳକୁ ବିହନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୬୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ୨୦ରୁ ୨୫ ସେମି ଲମ୍ବର ତଳ ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ତଳିଘେରା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଳିଘେରା କରି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଥମିକ ତଳିଘେରା ପାଇଁ ୧୦୦ ବର୍ଗମିଟର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଳିଘେରା ପାଇଁ ୫୦୦ ବର୍ଗ.ମି.



ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଧିକ ଖତ ବା ସଡ଼ାଗୋବର ଦେଇ ଜମିକୁ ଭଲରେ ଚାଷ କରି ହୁଡ଼ା କରି ତଳ କିମ୍ବା କନ୍ଦ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଗଛ ୧୫ଦିନର ହୋଇଗଲେ ୧ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଯାନ ସାର (ୟୁରିଆ) ଦେଇ ଗଛ ୪୫ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ତଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଳିଘେରାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ୪୫ ଦିନ ପରେ ୧ ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ୨୦-୨୫ ସେମି ଖଣ୍ଡ କରି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ:

ଜମିକୁ ୨ରୁ ୩ ଓଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟନ୍ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମଇ ଦେଇ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି, ଜମି ସମତଳ କରନ୍ତୁ । ହୁଡ଼ାରୁ ହୁଡ଼ା ୩ ଫୁଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ଚଉଡ଼ା ୨ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ୧.୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ହୁଡ଼ା ଟେକନ୍ତୁ । ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ବିହନ ତଳ, ତଳକୁ ତଳ ୨୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପରି ପୋତକୁ ଯେପରି ତଳର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଡି ମାଟି ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମାଟି ଭିତରକୁ ରହିବ ।



ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର:

ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ୧୮ ଟନ୍ କନ୍ଦମୂଳ ମିଳୁଥିବା ଏକ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ପାଇଁ ୪୧ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ୧୪ କିଗ୍ରା ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ୬୮ କିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାର ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦-୭୫ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ୨୫-୫୦ କିଗ୍ରା ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ୫୦-୭୫ କିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଜୈବିକ ଗୁଣସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ



ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର,
ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-କନ୍ଦଫସଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା
ଡୁମୁଡୁମା ହାଉସିଂବୋର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୯

ହିଡ଼ ଟେକିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାଝାଣ ପଟାସ୍ ସାରକୁ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷରେ ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାକି ସାରକୁ ଅଧାକରି ୩୦ ଏବଂ ୫୦ ଦିନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସିଆରରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ାକୁ ମାଟି ଟେକିଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ । ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣି କଣିଆ ମାଟିରେ ବୋରନ୍ ନାମକ ଅଣୁସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସାର ଅଭାବ ହେଲେ କନ୍ଦ ଫାଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ କନ୍ଦ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ବୋରନ୍ ଅଭାବରୁ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ପରି ଖାଲି ଚେର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଥାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ:

କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଡ଼ମାସ ଅନାବନା ଘାସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫସଲ ୨୫-୩୦ ଦିନ ହୋଇଗଲେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଅନାବନା ଘାସ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଏହାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଡ଼ାଖୁସାକରି ଘାସବାଛି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ାକୁ ମାଟି ଟେକନ୍ତୁ । ୪୫ ଦିନ ପରେ କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲରେ ଡଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଏହାର ଅମଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ।

ଜଳସେଚନ:

ବିହନ ଡଙ୍କରୁ ଚେର ବାହାରିବା ଲଟା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାସ ମାଟିରେ ବତର ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଜଳସେଚିତ ରବି ଫସଲରେ ବିହନ ଡଙ୍କ ରୋପଣ ପରେ ହାଲୁକା ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଜରୁରୀ । ମାଟିର ବତର ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଦେଡ଼ମାସ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨-୩ ଥର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନାହିଁ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ:

ଶୁଣି ବା ଘୁଣି ପୋକ କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ । ଏହି ପୋକ ଶତକଡ଼ା ୨୫ରୁ ୯୦ ଭାଗ ଅମଳ କମାଇଦିଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଲ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଘୁଣିପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବାକୁ ପିତା ଲାଗେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅଟେ ।

ଘୁଣିପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

- ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଖରାଟିଆ ଗଭୀର ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରୁ ପୂର୍ବଫସଲର ଅବଶେଷ ଏବଂ ଅନାବନାଘାସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଘୁଣିପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ଆଗ ଡଙ୍କକୁ ବିହନଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ଡଙ୍କ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶତକଡ଼ା ୦.୦୫ ଭାଗ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦ୍ରବଣରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୮-୧୦ କିଗ୍ରା କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୧୦ କିଗ୍ରା ବାଲି ମିଶାଇ ହୁଡ଼ା ଟେକିବା ସମୟରେ (୪୫ ଦିନରେ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଲାଲ୍ ଉଜ୍ଜ କିମ୍ବା ଘୁଣିପୋକ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

- ୩୦ ଏବଂ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ହିଡ଼କୁ ମାଟି ଟେକନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଜଳସେଚନ କରି ମାଟିରେ ବତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଘୁଣି ପୋକ ଫସଲରେ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ଶତକଡ଼ା ୦.୦୫ଭାଗ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ସଅଳ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଘୁଣି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଘୁଣି ପୋକ ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡସଡ଼ା ଏବଂ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ବିଶେଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ଗ୍ରାମ୍ ସାଫ୍ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ:

କନ୍ଦମୂଳ କିସମ ଅନୁସାରେ ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଘୁଣି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫସଲ ସଅଳ ଅମଳ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଫାଉଡ଼ା ବା ଦେଶୀ ଲଙ୍ଗଳରେ କନ୍ଦମୂଳ ତାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି କନ୍ଦମୂଳ କଟି ନଷ୍ଟ ନହେବ । ଖଣ୍ଡିଆ ବା ପୋକଡ଼ା କନ୍ଦମୂଳ ବାଛି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଭଲ କନ୍ଦମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ପବନ ଯାତାୟତ ହେଉଥିବା ଘର ଚଟାଣରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଖେଳାଇକରି ରଖନ୍ତୁ । ସତ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କନ୍ଦମୂଳରୁ ଜଳାୟ ଅଂଶ କମି ଚୋପା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ କନ୍ଦମୂଳକୁ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରୀ କରିଦେବା ଦରକାର । ବିକ୍ରୀ ନହେଲେ କାଟି ପାଉଡ଼ର କରି ଡିବା ବନ୍ଦକରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏକ ହେକ୍ଟର କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲ ପାଇଁ ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ୧ଲକ୍ଷରୁ ୧ଲକ୍ଷ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।



ଲେଖକ:

ଏମ୍.ନେତୁନ୍‌ଚେଟ୍ତିୟାନ୍
ପି.ଏସ୍.ଶିବକୁମାର, କେ.ଏଚ୍.ଗୌଡ଼, ସନ୍ଦିପ ପଣ୍ଡା
ଚନ୍ଦନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଟ

ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ

ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନ୍ଦ ଫସଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ
ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୯, ଦୂରଭାଷ: ୦୬୭୪-୨୫୭୦୮୨୮/ ୨୫୭୨୫୮୮